

治療前



治療後



主訴	でこぼこが気になる。
治療内容	抜歯(上顎左右第一小臼歯、下顎左右第一小臼歯)、ホールディングアーチ、マルチブラケット装置(ワイヤー)
患者様の年齢	16歳
患者様の性別	女性
治療期間	2年6か月(30回)
治療費(税別)	検査診断料40,000円+基本矯正料740,000円+動的治療費5,000×30回=150,000=合計930,000
治療で得られるメリット	重度でこぼこ、口元の突出感の改善
治療する際に起こるリスク・副作用	矯正歯科装置装着後に違和感、不快感、痛みなどが生じることがあります。一般的には数日間～1、2週間慣れてきます。 歯の動き方には個人差があります。そのため予想された治療期間が延長する可能性があります。 矯正歯科装置の使用状況、顎間ゴムの使用状況、定期的な通院など、矯正歯科治療には患者さんの協力が必要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。 治療中は矯正歯科装置が歯の表面に付いているため食物が溜りやすく、また歯が磨きにくくなるため、むし歯や歯周病が生じるリスクが高まります。したがってハミガキを適切に行い、お口の中を常に清潔に保ち、さらにかかりつけ 歯科 医に定期的に受診することが大切です。また、歯が動くに伴って歯が見えるようになることもあります。 歯を動かすことにより歯根が吸収して短くなることや歯肉がやせて下がる場合があります。 ごくまれに歯が骨と癒着して歯が動かないことがあります。 ごくまれに歯を動かすことで神経が障害を受けて麻痺することがあります。 矯正歯科装置などにより金属等のアレルギー症状が出る場合があります。 治療中に顎関節の痛み、音が鳴る、口が開けにくいなどの顎関節症状が生じることがあります。 治療の経過によっては当初予定していた治療計画を変更する可能性があります。 歯の形の修正や咬み合わせの微調整を行ったりする可能性があります。 矯正歯科装置を損壊する可能性があります。 矯正歯科装置を外す際にエナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、からせ物(補綴物)の一部が破壊する可能性があります。 動的治療が終了し装置を外れた後に、現在の咬み合わせに合った状態のかみせ物(補綴物)やむし歯の治療(修復物)などをやりなおす必要性が生じる可能性があります。 動的治療が終了し装置を外れた後に保定装置を指示通り使用しないと、歯並びや咬み合わせの「後戻り」が生じる可能性があります。 あごの成長発育により咬み合わせや歯並びが変化することがあります。 治療後に知らずの影響で歯並びや咬み合わせに変化が生じる可能性があります。また、加齢や歯周病などにより歯並びや咬み合わせが変化することがあります。 矯正歯科治療は一度始めると元の状態に戻すことは難しくなります。