

治療前



治療後



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主訴               | 前歯が出ている。下の前歯が1本少ない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 治療内容             | ヘッドギア、マルチブラケット装置(ワイヤー)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 患者様の年齢           | 9歳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 患者様の性別           | 男児                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 治療期間             | 1年6か月(13回)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 治療費(税別)          | 検査診断料40,000円+基本矯正料350,000円+動的治療費5,000円×13回=65,000円=合計455,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 治療で得られるメリット      | 口元の突出感の改善、上顎前歯の唇側傾斜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 治療する際に起こるリスク・副作用 | <p>矯正歯科装置装着後に違和感、不快感、痛みなどが生じることがあります。一般的には数日間～1、2週間で慣れます。</p> <p>歯の動き方には個人差があります。そのため予想された治療期間が延長する可能性があります。</p> <p>矯正歯科装置の使用状況、顎間ゴムの使用状況、定期的な通院など、矯正歯科治療には患者さんの協力が必要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。</p> <p>治療中は矯正歯科装置が歯の表面に付いているため食物が溜りやすく、また歯が磨きにくくなるため、むし歯や歯周病が生じるリスクが高まります。したがってハミガキを適切に行い、お口の中を常に清潔に保ち、さらにかかりつけ歯科医に定期的に受診することが大切です。また、歯が動くと思われる歯が揺れるようになることもあります。</p> <p>歯を動かすことにより歯根が吸収して短くなることや歯肉がやせて下がる場合があります。</p> <p>ごくまれに歯が骨と癒着していて歯が動かない場合があります。</p> <p>ごくまれに歯を動かすことで神経が障害を受けて麻痺することがあります。</p> <p>矯正歯科装置などにより金属等のアレルギー症状が出る場合があります。</p> <p>治療中に顎関節の痛み、首が痛む、口が開けにくいなどの顎関節症状が生じることがあります。</p> <p>治療の経過によっては最初予定していた治療計画を変更する可能性があります。</p> <p>歯の形の修正や咬み合わせの調整を行ったりする可能性があります。</p> <p>矯正歯科装置を脱落する可能性があります。</p> <p>矯正歯科装置を外す際にエナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、かぶせ物(補綴物)の一部が破損する可能性があります。</p> <p>動的治療が終了し装置が外れた後に、固定の咬み合わせに合った状態のかぶせ物(補綴物)やむし歯の治療(補綴物)などをやりなおす必要性が生じる可能性があります。</p> <p>動的治療が終了し装置が外れた後に保定装置を指示通り使用しないと、歯並びや咬み合わせの「後戻り」が生じる可能性があります。</p> <p>あごの成長発育により咬み合わせや歯並びが変化することがあります。</p> <p>治療後に知らずのうちに歯並びや咬み合わせに変化が生じる可能性があります。また、加齢や歯周病などにより歯並びや咬み合わせが変化することがあります。</p> <p>矯正歯科治療は一度始めると元の状態に戻すことは難しくなります。</p> |